Δ BARYONS
($S = 0$, $I = 3/2$)

$\Delta^{++} = uuu$, $\Delta^{+} = uud$, $\Delta^{0} = udd$, $\Delta^{-} = ddd$

$\Delta(1232)$ P_{33}

$I(J^P) = \frac{3}{2}(\frac{3}{2}^+)$

Breit-Wigner mass (mixed charges) = 1230 to 1234 ($\approx$ 1232) MeV
Breit-Wigner full width (mixed charges) = 115 to 125 ($\approx$ 120) MeV
p_{beam} = 0.30 GeV/c $4\pi\lambda\!\!\!^{-2}$ = 94.8 mb
Re(pole position) = 1209 to 1211 ($\approx$ 1210) MeV
-2Im(pole position) = 98 to 102 ($\approx$ 100) MeV

$\Delta(1232)$ DECAY MODES	Fraction (Γ_i/Γ)	p (MeV/c)
$N\pi$	>99 %	227
$N\gamma$	0.52–0.60 %	259
$N\gamma$, helicity=1/2	0.11–0.13 %	259
$N\gamma$, helicity=3/2	0.41–0.47 %	259

$\Delta(1600)$ P_{33}

$I(J^P) = \frac{3}{2}(\frac{3}{2}^+)$

Breit-Wigner mass = 1550 to 1700 ($\approx$ 1600) MeV
Breit-Wigner full width = 250 to 450 ($\approx$ 350) MeV
p_{beam} = 0.87 GeV/c $4\pi\lambda\!\!\!^{-2}$ = 18.6 mb
Re(pole position) = 1500 to 1700 ($\approx$ 1600) MeV
-2Im(pole position) = 200 to 400 ($\approx$ 300) MeV

$\Delta(1600)$ DECAY MODES	Fraction (Γ_i/Γ)	p (MeV/c)
$N\pi$	10–25 %	512
$N\pi\pi$	75–90 %	473
$\Delta\pi$	40–70 %	301
$N\rho$	<25 %	†
$N(1440)\pi$	10–35 %	74
$N\gamma$	0.001–0.02 %	525
$N\gamma$, helicity=1/2	0.0–0.02 %	525
$N\gamma$, helicity=3/2	0.001–0.005 %	525

$\Delta(1620)\ S_{31}$

$I(J^P) = \frac{3}{2}(\frac{1}{2}^-)$

Breit-Wigner mass = 1615 to 1675 ($\approx$ 1620) MeV
Breit-Wigner full width = 120 to 180 ($\approx$ 150) MeV
p_{beam} = 0.91 GeV/c $\quad 4\pi\lambda\!\!\!^{-2}$ = 17.7 mb
Re(pole position) = 1580 to 1620 ($\approx$ 1600) MeV
-2Im(pole position) = 100 to 130 ($\approx$ 115) MeV

$\Delta(1620)$ DECAY MODES	Fraction (Γ_i/Γ)	p (MeV/c)
$N\pi$	20–30 %	526
$N\pi\pi$	70–80 %	488
$\Delta\pi$	30–60 %	318
$N\rho$	7–25 %	†
$N\gamma$	0.004–0.044 %	538
$N\gamma$, helicity=1/2	0.004–0.044 %	538

$\Delta(1700)\ D_{33}$

$I(J^P) = \frac{3}{2}(\frac{3}{2}^-)$

Breit-Wigner mass = 1670 to 1770 ($\approx$ 1700) MeV
Breit-Wigner full width = 200 to 400 ($\approx$ 300) MeV
p_{beam} = 1.05 GeV/c $\quad 4\pi\lambda\!\!\!^{-2}$ = 14.5 mb
Re(pole position) = 1620 to 1700 ($\approx$ 1660) MeV
-2Im(pole position) = 150 to 250 ($\approx$ 200) MeV

$\Delta(1700)$ DECAY MODES	Fraction (Γ_i/Γ)	p (MeV/c)
$N\pi$	10–20 %	580
$N\pi\pi$	80–90 %	547
$\Delta\pi$	30–60 %	385
$N\rho$	30–55 %	†
$N\gamma$	0.12–0.26 %	591
$N\gamma$, helicity=1/2	0.08–0.16 %	591
$N\gamma$, helicity=3/2	0.025–0.12 %	591

$\Delta(1905)\ F_{35}$ $I(J^P) = \frac{3}{2}(\frac{5}{2}^+)$

Breit-Wigner mass = 1870 to 1920 ($\approx$ 1905) MeV
Breit-Wigner full width = 280 to 440 ($\approx$ 350) MeV
$p_{\rm beam}$ = 1.45 GeV/c $\quad 4\pi\lambda\!\!\!^{-2}$ = 9.62 mb
Re(pole position) = 1800 to 1860 ($\approx$ 1830) MeV
-2Im(pole position) = 230 to 330 ($\approx$ 280) MeV

$\Delta(1905)$ DECAY MODES	Fraction (Γ_i/Γ)	p (MeV/c)
$N\pi$	5–15 %	713
$N\pi\pi$	85–95 %	687
$\Delta\pi$	<25 %	542
$N\rho$	>60 %	421
$N\gamma$	0.01–0.03 %	721
$N\gamma$, helicity=1/2	0.0–0.1 %	721
$N\gamma$, helicity=3/2	0.004–0.03 %	721

$\Delta(1910)\ P_{31}$ $I(J^P) = \frac{3}{2}(\frac{1}{2}^+)$

Breit-Wigner mass = 1870 to 1920 ($\approx$ 1910) MeV
Breit-Wigner full width = 190 to 270 ($\approx$ 250) MeV
$p_{\rm beam}$ = 1.46 GeV/c $\quad 4\pi\lambda\!\!\!^{-2}$ = 9.54 mb
Re(pole position) = 1830 to 1880 ($\approx$ 1855) MeV
-2Im(pole position) = 200 to 500 ($\approx$ 350) MeV

$\Delta(1910)$ DECAY MODES	Fraction (Γ_i/Γ)	p (MeV/c)
$N\pi$	15–30 %	716
$N\gamma$	0.0–0.2 %	725
$N\gamma$, helicity=1/2	0.0–0.2 %	725

$\Delta(1920)\ P_{33}$ $I(J^P) = \frac{3}{2}(\frac{3}{2}^+)$

Breit-Wigner mass = 1900 to 1970 ($\approx$ 1920) MeV
Breit-Wigner full width = 150 to 300 ($\approx$ 200) MeV
$p_{\rm beam}$ = 1.48 GeV/c $\quad 4\pi\lambda\!\!\!^{-2}$ = 9.37 mb
Re(pole position) = 1850 to 1950 ($\approx$ 1900) MeV
-2Im(pole position) = 200 to 400 ($\approx$ 300) MeV

$\Delta(1920)$ DECAY MODES	Fraction (Γ_i/Γ)	p (MeV/c)
$N\pi$	5–20 %	722

$\Delta(1930)\ D_{35}$ $I(J^P) = \frac{3}{2}(\frac{5}{2}^-)$

Breit-Wigner mass = 1920 to 1970 ($\approx$ 1930) MeV
Breit-Wigner full width = 250 to 450 ($\approx$ 350) MeV
$p_{\rm beam}$ = 1.50 GeV/c $4\pi\lambda\!\!\!^{-2}$ = 9.21 mb
Re(pole position) = 1840 to 1940 ($\approx$ 1890) MeV
-2Im(pole position) = 200 to 300 ($\approx$ 250) MeV

$\Delta(1930)$ DECAY MODES	Fraction (Γ_i/Γ)	p (MeV/c)
$N\pi$	10–20 %	729
$N\gamma$	0.0–0.02 %	737
$N\gamma$, helicity=1/2	0.0–0.01 %	737
$N\gamma$, helicity=3/2	0.0–0.01 %	737

$\Delta(1950)\ F_{37}$ $I(J^P) = \frac{3}{2}(\frac{7}{2}^+)$

Breit-Wigner mass = 1940 to 1960 ($\approx$ 1950) MeV
Breit-Wigner full width = 290 to 350 ($\approx$ 300) MeV
$p_{\rm beam}$ = 1.54 GeV/c $4\pi\lambda\!\!\!^{-2}$ = 8.91 mb
Re(pole position) = 1880 to 1890 ($\approx$ 1885) MeV
-2Im(pole position) = 210 to 270 ($\approx$ 240) MeV

$\Delta(1950)$ DECAY MODES	Fraction (Γ_i/Γ)	p (MeV/c)
$N\pi$	35–40 %	741
$N\pi\pi$		716
$\Delta\pi$	20–30 %	574
$N\rho$	<10 %	469
$N\gamma$	0.08–0.13 %	749
$N\gamma$, helicity=1/2	0.03–0.055 %	749
$N\gamma$, helicity=3/2	0.05–0.075 %	749

$\Delta(2420)\ H_{3,11}$ $I(J^P) = \frac{3}{2}(\frac{11}{2}^+)$

Breit-Wigner mass = 2300 to 2500 ($\approx$ 2420) MeV
Breit-Wigner full width = 300 to 500 ($\approx$ 400) MeV
$p_{\rm beam}$ = 2.64 GeV/c $4\pi\lambda\!\!\!^{-2}$ = 4.68 mb
Re(pole position) = 2260 to 2400 ($\approx$ 2330) MeV
-2Im(pole position) = 350 to 750 ($\approx$ 550) MeV

$\Delta(2420)$ DECAY MODES	Fraction (Γ_i/Γ)	p (MeV/c)
$N\pi$	5–15 %	1023