Ω BARYONS
$(S = -3,\ I = 0)$

$\Omega^- = sss$

Ω^-

$I(J^P) = 0(\frac{3}{2}^+)$

J^P is not yet measured; $\frac{3}{2}^+$ is the quark model prediction.

Mass $m = 1672.45 \pm 0.29$ MeV
$(m_{\Omega^-} - m_{\overline{\Omega}^+}) / m_{\Omega^-} = (-1 \pm 8) \times 10^{-5}$
Mean life $\tau = (0.821 \pm 0.011) \times 10^{-10}$ s
$c\tau = 2.461$ cm
$(\tau_{\Omega^-} - \tau_{\overline{\Omega}^+}) / \tau_{\Omega^-} = -0.002 \pm 0.040$
Magnetic moment $\mu = -2.02 \pm 0.05\ \mu_N$

Decay parameters

ΛK^- $\alpha = -0.026 \pm 0.023$
$\frac{1}{2}[\alpha(\Lambda K^-) + \alpha(\overline{\Lambda} K^+)] = -0.004 \pm 0.040$
$\Xi^0 \pi^-$ $\alpha = 0.09 \pm 0.14$
$\Xi^- \pi^0$ $\alpha = 0.05 \pm 0.21$

Ω^- DECAY MODES		Fraction (Γ_i/Γ)	Confidence level	p (MeV/c)
ΛK^-		(67.8±0.7) %		211
$\Xi^0 \pi^-$		(23.6±0.7) %		294
$\Xi^- \pi^0$		(8.6±0.4) %		290
$\Xi^- \pi^+ \pi^-$		$(4.3^{+3.4}_{-1.3}) \times 10^{-4}$		190
$\Xi(1530)^0 \pi^-$		$(6.4^{+5.1}_{-2.0}) \times 10^{-4}$		17
$\Xi^0 e^- \overline{\nu}_e$		(5.6±2.8) $\times 10^{-3}$		319
$\Xi^- \gamma$		$< 4.6 \times 10^{-4}$	90%	314
$\Delta S = 2$ forbidden ($S2$) modes				
$\Lambda \pi^-$	$S2$	$< 1.9 \times 10^{-4}$	90%	449

$\Omega(2250)^-$

$I(J^P) = 0(?^?)$

Mass $m = 2252 \pm 9$ MeV
Full width $\Gamma = 55 \pm 18$ MeV

$\Omega(2250)^-$ DECAY MODES	Fraction (Γ_i/Γ)	p (MeV/c)
$\Xi^-\pi^+ K^-$	seen	532
$\Xi(1530)^0 K^-$	seen	437